

**Désinfectant
Insecticide, bactéricide, et virucide**

COMPOSITION

Chlorure de didécyldiméthyl ammonium	18,75 g
Chlorure de dioctyldiméthyl ammonium	18,75 g
Chlorure d'octyldécyldiméthyl ammonium.....	37,50 g
Chlorure d'alkyldiméthylbenzyl ammonium.....	50,00 g
Glutaraldéhyde	62,50 g
Perméthrine	20,00 g
Excipients : tensio-actifs, parfums terpéniques, eau q.s.p.	1 litre

ASPECT

Forme : Liquide
Couleur : Bleue
Densité = 1
pH du concentré : 4.15 (± 0.35)
pH de solution à 2 % = 7 (± 0,5)

PROPRIÉTÉS

L'association d'ammoniums quaternaires et de glutaraldéhyde confère au **MEFISTO** une excellente efficacité bactéricide et virucide présence de matières organiques.

La Perméthrine est très active contre les insectes volants (mouches, moustiques, moucheron, ...) et les insectes rampants (ténébrions, ...).

La Perméthrine a une action initiale rapide, ainsi qu'une excellente rémanence (6 à 12 semaines).

USAGES ET DOSES D'EMPLOI

Les doses d'homologation figurant ci-dessous serviront de guide d'utilisation en fonction du traitement recherché. Elles peuvent être augmentées en cas de nécessité : épidémie, pathologie importante, augmentation du microbisme.

A. **MEFISTO** est homologué par le Ministère de l'Agriculture sous le n° 9700593 du 01/12/1997 pour les domaines d'activités suivants :

ANIMAUX DOMESTIQUES	Bactéricide	Virucide	Insecticide
• Logement d'animaux	0,75 %	2 %	2 %
• Matériel de transport	0,75 %	2 %	2 %
• Matériel d'élevage	0,75 %	2 %	2 %

B. **MEFISTO** : Activités complémentaires :

Fongicide	%
• Absidia Corymbifera	7,5
• Aspergillus Versicolor	7,5
• Cladosporium Cladosporioides	2,5

Désinfectant Insecticide, bactéricide, et virucide

Virucide	%
• Maladie de Gumboro • Myxomatose • Parvovirus Porcin • Circovirus PCV2 • Peste Porcine Classique • Maladie de Newcastle • Maladie d'Aujeszky	0,1 (eau dure) 0,1 (eau dure) 1 1 0,1 0,2 0,1

UTILISATION ET MODE D'EMPLOI

Pulvérisation ou trempage après dilution dans l'eau. En pulvérisation, prévoir 0,3 litre de solution diluée par m². Exemple de dilution dans le tableau ci-dessous.

Tableau : 1^{ère} désinfection

	Eau (Litre / m ²)	MEFISTO (%)	Solution / 100 m ² de surface développée	
			Eau	MEFISTO
Pulvérisation	0,2 à 0,4 L	0,75 - 2	30 L	0,225 à 0,6 L

MEFISTO peut également s'utiliser avec un un générateur de mousse (canon à mousse...).

Bien mélanger la solution mère avant de la verser dans le réservoir du canon à mousse .

Nébulisation et Thermonébulisation : 24 ou 48 heures avant le retour des animaux « Désinfection terminale ».

Tableau : 2^{ème} désinfection

	MEFISTO		Adjuvant Thermo
	ml / m ³	Pour un	volume de 100 m ³
Nébulisation	5	0,5 litre	/
Thermonébulisation	2	0,2 litre	30 ml (15%)

☒ L'utilisation de **MEFISTO** en thermonébulisation doit s'effectuer dans des locaux hermétiquement fermés, ventilation arrêtée, h présence animale et humaine (sauf équipements appropriés).

☒ Pour améliorer la diffusion du **MEFISTO** par thermonébulisation nous vous conseillons d'ajouter notre **Adjuvant Thermo** à raison de 15% du besoin en volume de **MEFISTO** .

Pack **MEFISTO THERMO** disponible avec 1,5 litres **Adjuvant THERMO** + 10 litres de **MEFISTO**

**Désinfectant
Insecticide, bactéricide, et virucide****COMPATIBILITES CHIMIQUES**

MEFISTO est compatible avec les produits de nettoyage de type détergents (Alcalin) formulés avec des tensio-actifs cationiques et non ioniques.

Par précaution, il faut bien rincer les surfaces après une détergence pour garantir l'efficacité du désinfectant.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas traiter en présence des animaux.
- L'application de **MEFISTO** sur des surfaces en contact avec les matières alimentaires (les auges, les abreuvoirs...) devra être rincée abondamment à l'eau.
- En cas de thermonébulisation, ne pas placer le thermonébulisateur à proximité de matières inflammables.

Ecotoxicité :

Produit toxique pour les abeilles, les poissons et la faune aquatique.

Ne pas jeter les reliquats ou les eaux de rinçage du matériel de pulvérisation dans les cours d'eau.

TOXICOLOGIE

* DL50 orale (rat) = > 2000 mg

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**Phrases de risques**

- R 20 : Nocif par inhalation.
R 37/38 : Irritant pour les voies respiratoires et la peau.
R 41 : Risque de lésions oculaires graves.
R 42/43 : Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau.

Phrases de sécurité

- S 2 : Conserver hors de la portée des enfants.
S 13 : Conserver à l'écart des aliments et boissons (y compris ceux pour animaux).
S 20/21 : Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.
S 24 : Eviter le contact avec la peau.
S 26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S 36/37/39 : Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux et du visage.

Formule déposée au centre anti-poison.



Xn - NOCIF

Pour plus d'informations, consulter la Fiche de Sécurité.

CONSERVATION

MEFISTO se conserve dans son emballage d'origine pendant 3 ans. Nous conseillons un stockage dans un local tempéré.

PRESENTATION

Bidon de 1 Litre	Code CIP : 7384044
Bidon de 5 Litres	Code CIP : 7384050
Bidon de 10 Litres	Code CIP : 7384067
Bidon de 25 Litres	Code CIP : 7606852

Pack Mefisto Thermo Code : 2527065

↪ contient 1 bidon de 10 litres de **MEFISTO** + 1 bidon d' 1,5 litres d'Adjuvant Thermo.